


Comment se traite-t-il ?

La compression est capitale dans le traitement des ulcères de jambe veineux.

Les bandes de compression pressent doucement la zone autour de l'ulcère, ce qui favorise la cicatrisation en améliorant la circulation sanguine.

Pourquoi les bandes de compression sont-elles recommandées pour cicatriser ?



SANS COMPRESSION

Les valvules endommagées conduisent à un mauvais retour veineux et à une augmentation de la pression dans les veines de la jambe.


PAS DE CICATRISATION

AVEC COMPRESSION

La pression appliquée par les bandes améliore le retour veineux et aide les valvules à agir correctement.



CICATRISATION

En diminuant la pression veineuse les bandes de compression permettront de :



Réduire
l'œdème

Réduire
la taille de
la plaie



Réduire
la douleur



Il est recommandé de porter **les bandes de compression en continu, jour et nuit, et ce jusqu'à cicatrisation complète.**

**Pour en apprendre plus sur
l'insuffisance veineuse,
rendez-vous ici**



PORTEZ DES BANDES DE COMPRESSION ÇA VOUS FAIT UNE BELLE JAMBE 😊

Illustrations de patients portant des bandes
de compression **UrgoK2**

Favorisez
votre retour
veineux.



Maintenez vos
activités.



Chaussage
facile¹.



Simple à poser
par votre
infirmier(ère)².

Astuces :

Mettre un bas ou une chaussette au-dessus de vos bandes de compression. **Ni vu, ni connu !**

Mettre les bandes de compression **UrgoK2** au réfrigérateur à 4° pendant 2h30 pour **un peu de fraîcheur** ³!