


LE PANSEMENT HYDROCELLULAIRE AVEC UNE MATRICE CICATRISANTE¹ AYANT PROUVÉ SON EFFICACITÉ



EFFICACITÉ PROUVÉE ET RECONNUE

HAS
HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

ASA III³ Dans l'ulcère du pied diabétique
ASA IV⁴ Dans l'ulcère de jambe veineux

TAILLES DISPONIBLES :




8 x 8 cm




10 x 12 cm



13 x 15 cm



17 x 20 cm



20 x 20 cm
Sacrum



NON SUBSTITUABLE⁵



UrgoStart Plus n'a pas d'équivalence thérapeutique

COMMENT PRESCRIRE ?



L'ordonnance doit être la plus précise possible :

- ✓ Dénomination commerciale
- ✓ Taille
- ✓ Quantité de produits nécessaires
- ✓ Fréquence recommandée de renouvellement

Coordonnées prescripteur
avec N° d'identification
professionnel

Coordonnées Patient (nom,
prénom)

Date : / /

URGOSTART PLUS BORDER

Taille : 13 x 15 cm

Quantité : 2 boîtes

Durée : 1 mois, renouvelable 3 fois.

Non substituable

Cette illustration est donnée à titre d'exemple

UrgoStart plus
Border



Repositionnable



Adhésif doux



Permet la douche



Taille	Boîte	Code Hospitalier	Code ville
8 x 8 cm	16	754216	35468.900.399.75
10 x 12 cm	16	603025	35468.900.425.6.2
13 x 15 cm	16	603014	35468.900.425.2.4
17 x 20 cm	16	603016	35468.900.425.5.5
20 x 20 cm	16	602891	35468.900.419.4.7

100% remboursable

⁵TLC-NOSF : Technologie Lipido-Colloïde - Nano OligoSaccharide Factor (KSOS : Sel de Sucrose Octasulfate de Potassium).

(1) Münter KC, Meaume S, Augustin M, Senet P, Kérihuel J.C. The reality of routine practice: a pooled data analysis on chronic wounds treated with TLC-NOSF wound dressings. J Wound Care. 2017 Feb; 26 (Sup2): 54-515. Erratum in: J Wound Care. 2017 Mar; 2:26(3): 153. (2) In vitro study, internal data - Laboratoires Urgo. (3) ASA III : dans l'ulcère du pied chez le patient diabétique, d'origine neuro-ischémique (ischémie non critique), non infecté (critères d'infection IDSA / IWGDF) en phase de bourgeonnement (traitement séquentiel). (4) ASA IV : dans l'ulcère de jambe veineux ou mixte à prédominance veineuse, en phase de bourgeonnement (traitement séquentiel). (5) Lorsque prescrit en nom de marque, sauf accord exprès et préalable du prescripteur ou urgence et intérêt du patient le justifiant.

Gamme UrgoStart Plus : Dispositifs Médicaux de classe IIb (BSI CE 2797). Intégralement remboursables LPPR (Sec. Soc. : 60% + Mutuelle : 40%) dans le traitement de l'ulcère de jambe veineux ou mixte à prédominance veineuse, en phase de bourgeonnement (traitement séquentiel), et dans l'ulcère du pied chez le patient diabétique d'origine neuro-ischémique (ischémie non critique), non infecté (critères d'infection IDSA/IWGDF), en phase de bourgeonnement (traitement séquentiel). Indications: Traitement des plaies cutanées suivantes: ulcères de jambe, plaies du pied diabétique, escarres, autres plaies à risque de cicatrisation de longue durée, plaies récurrentes, ou plaies à risque de retard de cicatrisation. Contre indications: plaies cancéreuses, fistuleuses, nécrotiques, hémorragiques, plaies sur muqueuses, hypersensibilité connue à l'un des pansements avec matrice TLC ou TLC-NOSF, ou à la carboxyméthylcellulose (CMC). Lire attentivement la notice avant utilisation.

Fabricant : Laboratoires URGO - 04/2026 - 804186

